

Attualmente l'incidenza di epatite acuta sintomatica è di:

***B=0.9/100.000/anno che significa 540 nuovi casi/anno**

***C=0.2/100.000 anno che significa 180 nuovi casi/anno**

***D=0.2/1.000.000 che significa 18 nuovi casi/anno**

Per l'epatite B e C i principali fattori di rischio sono:

I trattamenti estetici

La terapia odontoiatrica


L'attività sessuale promiscua e, solo per l'epatite C, l'uso di droghe per via endovenosa e gli interventi chirurgici.

Rapporti ISTISAN 12/4 (anno 2012) Epidemiology of acute viral hepatitis in Itali: results of the surveillance through SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale Acuta)

**Questi dati raccolti dal SEIEVA
al 31/12/2010 riguardano
76.2% delle ASL italiane per
una sorveglianza totale di
41.332.167 cittadini= 72.6%
della POPOLAZIONE ITALIANA.**

Rapporti ISTISAN 12/4 (anno 2012) Epidemiology of acute viral hepatitis in Itali: results of the surveillance through SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale Acuta)


% di mortalità a causa delle Epatiti Virali Acute anni 2008/2010



Anni 1992-1994 / anni 2008-2010:


fattori di rischio registrati per epatite acuta D per i casi notificati in Italia in %

La somma delle % non dà il 100% perché mancano alcune cause secondarie o perché alcuni casi sono stati inseriti in più di un fattore di rischio



■ anno '92-'94
■ anno '08-'10

Anni 1992-1994 / anni 2008-2010: fattori di rischio registrati per epatite C per i casi notificati in Italia in %



La somma delle % non dà il 100% perché mancano alcune cause secondarie o perché alcuni casi sono stati inseriti in più di un fattore di rischio

Rapporti ISTISAN 12/4 (anno 2012)
Epidemiology of acute viral hepatitis in Italy: results of the surveillance through SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale Acuta)